

Арника монтана С9

Владелец регистрационного удостоверения:

ВОIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Арника монтана

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Арника монтана (<i>Arnica montana</i>)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Arnica montana - многолетнее растение, произрастающее преимущественно в горной местности.

Химический состав:

- флавоноиды и проантоцианиды;
- каротиноиды и марганец;
- фенольные кислоты (кофеиновая и хлорогеновая);
- сесквитерпеновые лактоны, в основном геленалин.

Компоненты растения обладают высокой биологической активностью:

- сесквитерпеновые лактоны обеспечивают противовоспалительное, антиэкхимозное и болеутоляющее свойства растения. Геленалин также обладает антисептическим действием;
- флавоноиды и проантоцианиды обладают сосудопротекторным действием.

Показания препарата Арника монтана

Ключевые симптомы для назначения препарата

- ушибы;
- боль;
- мышечная боль;

- гематомы.

Основные случаи клинического применения

Травматология

- удары, падения, раны, спортивные травмы, переломы;
- кровоизлияния;
- последствия родов, кефалогематома новорожденных;
- пред- и послеоперационная подготовка пациентов;
- посттравматический болевой синдром.

Мышечная слабость

- последствия длительного мышечного напряжения (длительные мышечные нагрузки, постстрессорная миалгия);
- охриплость у представителей голосо-речевых профессий (лекторы, учителя, певцы, ораторы) из-за перенапряжения голосовых связок;
- миалгия, вызванная стрессогенными ситуациями (траур и т.д.), с ощущением "побитости".

Отоларингология

- последствия травматизации тканей и слизистой оболочки после манипуляций и оперативных вмешательств (тонзиллэктомия и другое);
- профилактика и лечение носовых кровотечений.

Гематология

- петехиальные проявления на коже;
- кровоизлияние под конъюнктиву;
- гематомы или экхимозы;
- поверхностный флебит и перифлебит (после изучения этиологии для исключения тромбофлебита или флеботромбоза);
- варикозное расширение вен, телеангиэктазии;
- болезненность в нижних конечностях при варикозном расширении вен (препарат назначается длительно до 6-8 недель);
- гематурия (вместе с Фосфорус) в комбинации с традиционной терапией (препарат назначается длительно до 6-8 недель).

Стоматология

- воспалительные заболевания полости рта (в т.ч. стоматиты, гингивиты);
- последствия проведения стоматологических манипуляций (удаление зубов, дентальная имплантация и другое).

Офтальмология

- субконъюнктивальное кровоизлияние;
- ретинопатия, возрастная макулодистрофия.

Арника монтана используется в качестве вазопротектора*.

Гинекология

- эпизиотомия;
- кесарево сечение;
- подготовка к родам.

Дерматология

- розацея при симметричном расположении воспаленных областей;
- купероз.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Арника монтана возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Арника монтана

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Арника монтана

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

* Zicari D., Rkciotti F., Vingolo E.M., Zicari N. "Valutazione dell'azione angioprotettiva di preparati di Arnica nel trattamento della retinopatia diabetica", *Bottettino di oculistica*, anno 71, No. 5, 1992: pp. 841-848.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>