

АНТИМОНИУМ КРУДУМ С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Антимониум
крудум

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком
гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком
гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком
гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком
гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Антимониум крудум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
АНТИМОНИУМ КРУДУМ (ANTIMONIUM CRUDUM)	C9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально- химического происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Трисульфид сурьмы присутствует в стибните, минерале, являющемся основным источником сульфида сурьмы. В настоящее время его также получают методом химического синтеза. Он представляет собой мелкий порошок серого цвета с металлическими вкраплениями; нерастворим в воде и спирте, растворим в углекислом калии и щелочных сульфидах.

В медицине трисульфид сурьмы: в низких дозировках его применяли как отхаркивающее средство, а в высоких дозах в качестве рвотного препарата.

Сурьма воздействует на метаболизм углеводов и катехоламинов, вступая в соединения с SH-группами разных энзимов и глутатионом.

Показания препарата Антимониум крудум

Ключевые симптомы для назначения препарата

Симптомы в области желудочно-кишечного тракта и другие

- Язык, покрытый толстым налётом беловатого цвета, напоминающим молоко или мел.
- Отрыжка со вкусом съеденной пищи.
- Тошнота и обильная рвота пищей, которая не приносит облегчения.
- Водянистая диарея с вкраплениями твёрдых масс.
- Общая слабость.
- Красные веки, красные глаза.
- Кашель с выделением мокроты в ночное время с рвотой, дыхание слышно на расстоянии.

Симптомы в области кожи и кожных покровов

- Везикулярные или пустулёзные высыпания с импетигизированной поверхностью, особенно на лице и вокруг рта.
- Мокнущие и покрытые струпьями высыпания на коже головы.
- кератоз:
 - фиссуральный и кератозный дерматит,

– твёрдые ороговевшие наросты, особенно на ладонях и ступнях, часто болезненные.

Основные случаи клинического применения

1 – Гастроэнтерология

- Расстройство желудка после переизбытка.
- Летняя диарея или диарея, связанная с непереносимостью пищи, с характерными изменениями лечения.

2 – Дерматология

- Импетиго.
- Мокнущий дерматоз.
- Инфекционная экзема.
- Фиссуральный и кератозный дерматит.
- Твёрдые ороговевшие наросты на коже.
- Роговые бородавки.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Антимониум крудум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Антимониум крудум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Антимониум крудум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14