

Апис меллифика С30

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: ЛП-000956 от 18.10.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Апис меллифика

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Апис меллифика (Apis mellifica)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат животного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Apis mellifica - медоносная пчела из отряда перепончатокрылых (Hymenoptera) семейства пчел настоящих (Apidae).

Химический состав:

- допамин, адреналин и норадреналин;
- каротин;
- калий в большом количестве.

Пчелиный яд содержит:

- ферменты - фосфолипазу А2, гиалуронидазу;
- пептиды - мелитин, апамин, МСD-пептид (англ. – Mast Cell Degranulating peptide);
- гистамин, допамин, норадреналин и серотонин;
- свободные аминокислоты - аланин, аргинин, цистин;
- ацетилхолин;
- липиды;
- моносахариды (монозы) - глюкоза, фруктоза;
- ацетат изоамила (летучее вещество).

Состав препарата свидетельствует о возможности раннего и быстрого действия лекарственного средства при воспалительных реакциях. Кроме того, фосфолипаза А2 и мелитин обладают иммуногенным действием.

Действие Апис меллифика быстрое, но краткосрочное. Все разведения являются активными, но предпочтительно не использовать Апис меллифика в разведениях ниже С9 из-за присутствия в материнской настойке фосфолипазы А2 и мелитина, имеющих сильное иммуногенное действие.

Показания препарата Апис меллифика

Ключевые симптомы для назначения препарата

- болевой синдром;
- отек;
- жжение.

Основные случаи клинического применения

Дерматология

Основанием для назначения препарата Апис меллифика могут стать все отеки аллергической или воспалительной природы:

- локального характера (укусы насекомых, ожоги I степени, пальпебральный отек, отек женских наружных половых органов, посттравматические отеки, воспаление крайней плоти, фурункул в начальной стадии, флебит поверхностных вен и перифлебит после этиологического заключения, исключающего тромбофлебит или флеботромбоз);
- общего характера (солнечная эритема, полиморфный фотодерматоз, крапивница, многоформная эритема, ангионевротический отек);
- крапивница:
 - аллергического происхождения (растения, пищевые продукты, лекарственные средства);
 - вызванная пищевой непереносимостью или токсичностью лекарственного средства;
 - холинергическая крапивница, часто неизвестного происхождения;
 - крапивница физического происхождения – пруриго, вызванное или усугубленное контактом с водой;
 - контактная крапивница (растения, косметические средства, профессиональные аллергические заболевания).

Необходимо провести этиологическое исследование тяжелой острой крапивницы и хронической крапивницы, чтобы убедиться в устранении аллергена и избежать возникновения серьезных анафилактических проявлений, требующих соответствующего лечения.

Оториноларингология

- отечный риносинусит;
- фарингит и ангина нестрептококкового происхождения с отеком язычка мягкого неба. Уменьшение боли в горле от холодной воды.

Офтальмология

- конъюнктивит, хемоз.

Ревматология

- посттравматический гидрартроз и острые воспалительные артриты с отеком розово-красного цвета.

Инфектология

- плевриты и перикардиты вирусного происхождения, иногда в сочетании с аллопатической терапией; обычно при лихорадке отмечается отсутствие жажды.

Урология

- интерстициальный цистит с уменьшенным выделением мочи, повышенным содержанием белка в моче, отечностью без жажды, анасарка.

Гинекология

- боли, связанные с появлением молока;
- боли, связанные с кистами яичников;
- воспаление яичников (особенно правого).

Неврология

- головные боли или вазомоторная мигрень.

Апис меллифика назначается, когда наступает очевидное улучшение при лечении боли холодными компрессами; в физиопатологическом плане назначение оправдано наличием воспаления с отечной составляющей, которое сопровождается вазомоторные расстройства.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Апис меллифика возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Апис меллифика

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Апис меллифика

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



**Представительство в России
ООО "Буарон"**

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>