

Арсеникум альбум С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

BOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Арсеникум альбум	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Арсеникум альбум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Арсеникум альбум (Arsenicum album)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Мышьяковистый ангидрид - белый кристаллический порошок, слаборастворимый, кисловатый на вкус.

Арсеникум альбум действует на нервную и сердечно-сосудистую системы, лимфатические сосуды, слизистые, серозные и синовиальные оболочки, мышечную ткань и кожу.

Показания препарата Арсеникум альбум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- астения;
- сильное жжение;
- крайняя чувствительность к холоду;
- страх смерти.

Основные случаи клинического применения

Показания при острой патологии

Гастрознтерология

- острый гастроэнтерит, с лихорадкой или без, со зловонным стулом, вызывающим ссадины и жжение, а также нарушением общего состояния;
- пищевая интоксикация;
- острые гепатиты.

Оториноларингология

- острые риносинуситы, с лихорадкой или без, сопровождающиеся ринореей с характерными симптомами;
- острая оталгия, отиты среднего уха с характерными симптомами.

Дерматология

- острые заболевания кожи инфекционного или воспалительного характера, обладающие местными или общими характеристиками лекарственного средства - опоясывающий лишай, фурункулы, карбункулы, рожистое воспаление, крапивница, острые дерматиты.

Инфектология

- острый лихорадочный синдром с усилением в ночное время, при котором преобладают чередование фаз возбуждения и фаз астении, чувствительность к холоду и характерная жажда.

Неврология

- боль, острая невралгия, улучшение при которых наступает от воздействия тепла.

Урология

- острый цистит, нефрит (в качестве дополнения к соответствующей антибактериальной терапии), протеинурия.

Гинекология

- метрит, вагинит (в дополнение к соответствующей антибактериальной терапии).

Показания при хронической патологии

Оториноларингология

- хронический риносинусит, сезонный или круглогодичный, воспалительный или инфекционный;
- рецидивирующий отит, хроническая оторея.

Дерматология

- хронические дерматозы: сухая экзема, псориаз, старческий зуд, псориазоподобные дерматозы;
- профилактика пролежней.

Пульмонология

- астма.

Гастроэнтерология

- хронический гастрит, рецидивирующая язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- колопатия.

Инфектология

- хронические гнойные инфекции (в т.ч. зубные, ушные, мочеполовых органов).

Общее состояние

- астения, снижение массы тела вследствие затянувшихся болезненных состояний;
- реактивная депрессия вследствие деморализующих хронических заболеваний.

Неврология

- болевой синдром, невралгия.

Урология

- рецидивирующий цистит, нефрит.

Гинекология

- рецидивирующий метрит, вагинит.

Кардиология

- гипотензия, нарушения ритма, гипосистолии (используется как вспомогательное средство при лечении кардиотониками и диуретиками).

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Арсеникум альбум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Арсеникум альбум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Арсеникум альбум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14