

БАРИТА КАРБОНИКА С30 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

[VOIRON](#) (Франция)

Контакты для обращений:

[БУАРОН](#) (Франция)

Код АТХ: [V30](#) (Не присвоен)

Лекарственные формы

Барита карбоника	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Барита карбоника

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
БАРИТА КАРБОНИКА (BARYTA CARBONICA)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: [Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения](#)

Фармако-терапевтическая группа: [Гомеопатическое средство](#)

Фармакологическое действие

Карбонат бария используется в измеряемых дозах в лекарственных препаратах общепринятой медицины:

- гипертензивное действие на артериальное кровообращение, вызванное атеросклерозом сосудов
- воздействует на склеротическую дегенерацию соединительной ткани

Показания препарата Барита карбоника

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Слабость мыслительная, нервная и телесная.
- Хроническая гипертрофия миндалин с частым воспалением.
- Тенденция к нагноению ЛОР-органов, что вызывает затрудненное глотание и сопровождается объемной подчелюстной и шейной лимфаденопатией.
- Задержка психомоторного развития.
- Задержка полового созревания.

Основные случаи клинического применения

1. Заболевания уха, горла, носа

- Гипертрофированные миндалины, профилактика рецидивирующего тонзиллита

2. Поведенческие расстройства

- Задержка физического и особенно умственного развития; проблемы с изучением предметов в школе

3. Расстройства, связанные со старением

- Гипертензия, вызванная атеросклерозом (в дополнение к назначенному аллопатическому лечению)
- Профилактика патологического старения
- Легочный склероз (пневмосклероз) и хронический бронхит у лиц пожилого возраста.
- Двигательные и интеллектуальные последствия инсультов.
- Аденома простаты

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Барита карбоника возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Барита карбоника

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Барита карбоника

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

[БУАРОН](#) (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14