

## Белладонна С30

**Владелец регистрационного удостоверения:**

**VOIRON** (Франция)

**Контакты для обращений:**

**БУАРОН** (Франция)

**Код АТХ: V30** (Не присвоен)

**Лекарственная форма**

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

### Форма выпуска, упаковка и состав препарата Белладонна

<i>Гранулы гомеопатические</i>	<b>Разведение</b>
Белладонна (Belladonna)	С30

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

#### Фармакологическое действие

Belladonna – дикорастущее растение с овальными листьями, распространенное в центральной и средиземноморской частях Европы.

Химический состав - в основном, алкалоиды с парасимпатиколитическим действием:

- атропин, который образуется в результате рацемизации гиосциамина, основной алкалоид, присутствующий в свежем растении, его действие является преобладающим во всей токсикологии и во всем патогенезе;
- скополамин или гиосцин.

Белладонна обладает антихолинергическим действием благодаря конкурентному антагонизму с ацетилхолином (в особенности на мускариноподобное воздействие ацетилхолина). Также воздействует на периферическую (ослабление гладких мышц) и центральную нервную систему.

#### Показания препарата Белладонна

**Ключевые симптомы для назначения препарата**

- сухость слизистых оболочек;
- гиперемия, в т.ч. лица;
- жар, пот;
- воспаление;
- пульсирующие боли;
- спастические боли (в самом начале и в конце – внезапные).

## **Основные случаи клинического применения**

### *Инфектология*

- ринофарингит, нестрептококковая ангина\*, начинающийся ларинготрахеит;
- сухость слизистых оболочек, часто сопровождающаяся спазматическими явлениями в затронутой области (дисфагия, сухой кашель);
- конгестивный средний отит (пульсирующая боль в ухе);
- абсцесс в процессе формирования;
- скарлатиноидные высыпания;
- лихорадка с гиперемией, жаром, потом.

Назначение лекарственного средства подчиняется основным принципам:

- чем больше подобие между реакциями больного и патогенетическими свойствами лекарственного средства, тем более высоким должно быть используемое разведение, и наоборот;
- следует увеличивать интервал по мере улучшения состояния.

### *Кардиология*

- головные боли, связанные с артериальной гипертензией;
- гипертонический криз.

### *Гинекология*

- приливы жара при менопаузе.

### *Офтальмология*

- острый или хронический конъюнктивит с сильной светобоязнью, гиперваскуляризацией конъюнктивы и сухостью глаз;
- ячмень;
- синдром "сухого глаза" различной этиологии (в т.ч. при менопаузе, продолжительном пребывании в комнате с кондиционированным воздухом, синдроме Гужеро-Шегрена);
- непереносимость контактных линз из-за сухости конъюнктивы;
- светобоязнь, особенно после расширения зрачка для осмотра глазного дна.

### *Дополнительные клинические случаи применения*

- мозговое кровоизлияние с чувством жара и покраснением лица;
- головные боли с повышенной температурой или без нее;
- солнечный удар;
- ожоги I степени;
- спазмы гладких мышц, солнечная эритема, радиодерматиты (начинающиеся и заканчивающиеся внезапно);
- икота;
- печеночная или почечная колика;
- сухожильно-мышечный тремор.

## **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

## **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

## **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

## **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

## **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

## **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Белладонна возможно применение иных лекарственных средств.

## **Условия хранения препарата Белладонна**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

## **Срок годности препарата Белладонна**

Срок годности - 5 лет.

## **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

\* Перед любым гомеопатическим лечением рекомендуется проводить тесты на выявление ангины, вызванной бета-гемолитическим стрептококком.

## **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



## **Представительство в России ООО "Буарон"**

127006 Москва  
Долгоруковская ул. 7, эт. 11  
Тел.: (495) 956-08-10  
Факс: (495) 956-08-14  
E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)  
<http://www.boiron.ru>