

Белладонна С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

МГ Белладонна

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Белладонна

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Белладонна (Belladonna)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство
Фармакологическое действие

Belladonna – дикорастущее растение с овальными листьями, распространенное в центральной и средиземноморской частях Европы.

Химический состав - в основном, алкалоиды с парасимпатиколитическим действием:

- атропин, который образуется в результате рацемизации гиосциамина, основной алкалоид, присутствующий в свежем растении, его действие является преобладающим во всей токсикологии и во всем патогенезе;
- скополамин или гиосцин.

Белладонна обладает антихолинергическим действием благодаря конкурентному антагонизму с ацетилхолином (в особенности на мускариноподобное воздействие ацетилхолина). Также воздействует на периферическую (ослабление гладких мышц) и центральную нервную систему.

Показания препарата Белладонна

Ключевые симптомы для назначения препарата

- сухость слизистых оболочек;
- гиперемия, в т.ч. лица;
- жар, пот;

- воспаление;
- пульсирующие боли;
- спастические боли (в самом начале и в конце – внезапные).

Основные случаи клинического применения

Инфектология

- ринофарингит, нестрептококковая ангина*, начинающийся ларинготрахеит;
- сухость слизистых оболочек, часто сопровождающаяся спазматическими явлениями в затронутой области (дисфагия, сухой кашель);
- конгестивный средний отит (пульсирующая боль в ухе);
- абсцесс в процессе формирования;
- скарлатиноидные высыпания;
- лихорадка с гиперемией, жаром, потом.

Назначение лекарственного средства подчиняется основным принципам:

- чем больше подобие между реакциями больного и патогенетическими свойствами лекарственного средства, тем более высоким должно быть используемое разведение, и наоборот;
- следует увеличивать интервал по мере улучшения состояния.

Кардиология

- головные боли, связанные с артериальной гипертензией;
- гипертонический криз.

Гинекология

- приливы жара при менопаузе.

Офтальмология

- острый или хронический конъюнктивит с сильной светобоязнью, гиперваскуляризацией конъюнктивы и сухостью глаз;
- ячмень;
- синдром "сухого глаза" различной этиологии (в т.ч. при менопаузе, продолжительном пребывании в комнате с кондиционированным воздухом, синдроме Гужеро-Шегрена);
- непереносимость контактных линз из-за сухости конъюнктивы;
- светобоязнь, особенно после расширения зрачка для осмотра глазного дна.

Дополнительные клинические случаи применения

- мозговое кровоизлияние с чувством жара и покраснением лица;
- головные боли с повышенной температурой или без нее;
- солнечный удар;
- ожоги I степени;
- спазмы гладких мышц, солнечная эритема, радиодерматиты (начинающиеся и заканчивающиеся внезапно);
- икота;
- печеночная или почечная колика;
- сухожильно-мышечный тремор.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Белладонна возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Белладонна

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Белладонна

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

* Перед любым гомеопатическим лечением рекомендуется проводить тесты на выявление ангины, вызванной бета-гемолитическим стрептококком.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14