

БЕРБЕРИС ВУЛЬГАРИС С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

[VOIRON](#) (Франция)

Контакты для обращений:

[БУАРОН](#) (Франция)

Код АТХ: [V30](#) (Не присвоен)

Лекарственные формы

Берберис вульгарис	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Берберис вульгарис

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
БЕРБЕРИС ВУЛЬГАРИС (BERBERIS VULGARIS)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: [Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения](#)

Фармако-терапевтическая группа: [Гомеопатическое средство](#)

Фармакологическое действие

Берберис вульгарис, или барбарис обыкновенный используется в измеряемых дозах в лекарственных препаратах общепринятой медицины:

- в качестве жаропонижающего и желчегонного средства;
- обладает спазмолитическим, цитотоксическим и гипотензивным действием и оказывающий мутагенное воздействие на дрожжевые клетки (интеркалирующий агент).

Показания препарата Берберис вульгарис

Ключевые симптомы для назначения препарата

- боль в поясничной области, особенно с локализацией справа, идущая сверху вниз, распространяющаяся на бедра, колени, пятки
- диспепсия, сопровождающаяся тошнотой, густой слюной, сонливостью после еды, стулом бледного желтоватого цвета с чередованием запоров и диареи;
- зудящий кольцевидный дерматоз с отшелушиванием кожи в виде тонких хлопьев и формированием пигментированных ареол;
- гиперурикемия, сопровождающаяся нарушениями со стороны мочевыделительной системы или со стороны суставов. Моча – темно-красная с обильным осадком.

Основные случаи клинического применения

1. Урология

- Мочекаменная болезнь, в частности мочеислый литиаз.
- Все заболевания, сопровождающиеся недостаточным диурезом.
- Воспаление яичек и семенного канальца.

2. Гепато-гастроэнтерология

- Дисфункция печечно-пузырных протоков: диспепсия, диспепсия, связанная с переизданием.
- Камни в желчном пузыре.

3. Дерматология

- Кольцевидный дерматоз, розовый питириаз.
- Сухая экзема, псориазоподобный дерматоз.
- Паховый дерматомироз с зудом и жжением (почесуха Гебры), отрубевидный лишай (в дополнение к местному топическому лечению и хроническому лечению микоза), дерматофития туловища.

4. Ревматология

- Подагра и симптомы со стороны суставов у пациентов, страдающих гиперурикемией.

- Боли в поясничном и пояснично-крестцовом отделе.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- беременность;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Берберис вульгарис возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Берберис вульгарис

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Берберис вульгарис

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

[БУАРОН](#) (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14