

## Бриониа С30

### Владелец регистрационного удостоверения:

**VOIRON** (Франция)

### Контакты для обращений:

**БУАРОН** (Франция)

**Код АТХ: V30** (Не присвоен)

### Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

### Форма выпуска, упаковка и состав препарата Бриониа

<i>Гранулы гомеопатические</i>	<b>Разведение</b>
Бриониа (Врюониа)	С30

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

### Фармакологическое действие

Врюониа – вьющееся многолетнее растение с крупным корневищем. В гомеопатии используется основа Бриониа. Материнская настойка готовится из свежих подземных частей растения.

Химический состав:

- стеролы;
- ненасыщенные жирные кислоты;
- тритерпены;
- лектины;
- гетерозиды кукурбитацинов, по структуре близкие к кортикостероидам.

### Показания препарата Бриониа

#### *Ключевые симптомы для назначения препарата*

- болевой синдром с четкой точечной локализацией, с ухудшением при движении;
- сильная жажда с потребностью в большом количестве холодной воды;
- сухость слизистых оболочек (полости рта, носа и т.д.), поражение слизистых оболочек;
- боль в правом подреберье, сопровождающаяся приступами тошноты;
- область желудка чувствительна при пальпации;
- головокружения.

## **Основные случаи клинического применения**

### *Инфектология*

В инфектологии назначение особенно часто встречается при легочной патологии и заболеваниях ЛОР-органов.

Все лихорадочные синдромы, включающие:

- сильную жажду;
- упадок сил, сопровождающийся потоотделением, которое приносит облегчение;
- грипп и гриппозные состояния;
- инфекционные заболевания различной этиологии в самом начале;
- эпидемический паротит;
- ринит с сухостью слизистых оболочек, сопровождающийся сильной жаждой;
- трахеит или бронхит, при которых у пациента наблюдается сухой болезненный кашель, который:
  - обостряется при малейшем движении, особенно во время выслушивания, при разговоре или при входе в теплую комнату;
  - сопровождается загрудинной или грудной болью, с улучшением при сжатии грудной клетки руками с целью ее обездвижить.

### *Ревматология*

- артралгии различной локализации, если ухудшение наступает от движения, а улучшение – во время отдыха;
- гидрартроз, ревматические артриты, острые переходные синовиты ("раздраженное бедро"), которые обладают модальностями, присущими данному лекарственному средству.

### *Гастроэнтерология*

- диспептический синдром;
- гастрит;
- колит;
- запоры.

### *Гинекология*

- маститы, при которых чувствуется тяжесть в груди, а боль возникает при малейшем движении;
- боли, связанные с появлением молока\*.

### *Воспалительные синдромы*

- боли в животе, возникающие после эндоскопии брюшной полости;
- головные боли, возникающие после перидуральной анестезии;
- перикардит;
- головокружение;
- синдром "сухого глаза" различного происхождения (при менопаузе, длительном нахождении в комнате с кондиционером, синдроме Гужеро-Шегрена).

## **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

## **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

### **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

### **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Бриониа возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения препарата Бриониа**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

### **Срок годности препарата Бриониа**

Срок годности - 5 лет.

### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

\* Берреби А., Паран О., Ферваль Ф., Тен М., Аюби Ж.-М., Конан Л., Белон Ф. Лечение гомеопатией боли, связанной с нежелательным появлением молока, в непосредственном постнатальном периоде. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2001. Т. 30, № 4.

### **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



### **Представительство в России ООО "Буарон"**

127006 Москва  
Долгоруковская ул. 7, эт. 11  
Тел.: (495) 956-08-10  
Факс: (495) 956-08-14  
E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)  
<http://www.boiron.ru>