

Бриониа С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

МГ Бриониа	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Бриониа

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Бриониа (Bryonia)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство
Фармакологическое действие

Bryonia – вьющееся многолетнее растение с крупным корневищем. В гомеопатии используется основа Бриониа. Материнская настойка готовится из свежих подземных частей растения.

Химический состав:

- стеролы;
- ненасыщенные жирные кислоты;
- тритерпены;
- лектины;
- гетерозиды кукурбитацинов, по структуре близкие к кортикостероидам.

Показания препарата Бриониа

Ключевые симптомы для назначения препарата

- болевой синдром с четкой точечной локализацией, с ухудшением при движении;
- сильная жажда с потребностью в большом количестве холодной воды;
- сухость слизистых оболочек (полости рта, носа и т.д.), поражение слизистых оболочек;
- боль в правом подреберье, сопровождающаяся приступами тошноты;
- область желудка чувствительна при пальпации;

- головокружения.

Основные случаи клинического применения

Инфектология

В инфектологии назначение особенно часто встречается при легочной патологии и заболеваниях ЛОР-органов.

Все лихорадочные синдромы, включающие:

- сильную жажду;
- упадок сил, сопровождающийся потоотделением, которое приносит облегчение;
- грипп и гриппозные состояния;
- инфекционные заболевания различной этиологии в самом начале;
- эпидемический паротит;
- ринит с сухостью слизистых оболочек, сопровождающийся сильной жаждой;
- трахеит или бронхит, при которых у пациента наблюдается сухой болезненный кашель, который:
 - обостряется при малейшем движении, особенно во время выслушивания, при разговоре или при входе в теплую комнату;
 - сопровождается загрудинной или грудной болью, с улучшением при сжатии грудной клетки руками с целью ее обездвижить.

Ревматология

- артралгии различной локализации, если ухудшение наступает от движения, а улучшение – во время отдыха;
- гидрартроз, ревматические артриты, острые переходные синовиты ("раздраженное бедро"), которые обладают модальностями, присущими данному лекарственному средству.

Гастроэнтерология

- диспептический синдром;
- гастрит;
- колит;
- запоры.

Гинекология

- маститы, при которых чувствуется тяжесть в груди, а боль возникает при малейшем движении;
- боли, связанные с появлением молока*.

Воспалительные синдромы

- боли в животе, возникающие после эндоскопии брюшной полости;
- головные боли, возникающие после перидуральной анестезии;
- перикардит;
- головокружение;
- синдром "сухого глаза" различного происхождения (при менопаузе, длительном нахождении в комнате с кондиционером, синдроме Гужеро-Шегрена).

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Бриониа возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Бриониа

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Бриониа

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

* Берреби А., Паран О., Ферваль Ф., Тен М., Аюби Ж.-М., Конан Л., Белон Ф. Лечение гомеопатией боли, связанной с нежелательным появлением молока, в непосредственном постнатальном периоде. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2001. Т. 30, № 4.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14