

Гепар сульфур С30

Владелец регистрационного удостоверения:

BOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Гепар сульфур

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Гепар сульфур (Hepar sulfur)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Hepar sulfur calcareum - сероватый порошок с сероводородным запахом. Вещество почти не растворимо в воде и спирте, вступает в химические реакции подобно сере и кальцию.

Показания препарата Гепар сульфур

Ключевые симптомы для назначения препарата

- гнойное воспаление;
- гиперчувствительность к боли (непереносимость любых прикосновений к области воспаления) и холоду;
- ощущение болезненной пульсации;
- повышенная чувствительность волосистой части головы к прикосновениям;
- боль в ушах при сморкании;
- боль в горле, отдающая в уши.

Основные случаи клинического применения

Гепар сульфур показан, прежде всего, при воспалительных процессах и/или нагноениях любой локализации.

При острой патологии общим признаком является повышенная чувствительность затронутых областей и улучшение при местном наложении тепла.

При хронической патологии, при наличии нагноения, общим признаком является неприятный запах гноя.

Дерматология

- фурункулы, абсцессы, карбункулы, гидраденит, импетиго и гнойные высыпания. Метод назначения необходимо соблюдать в точности, с одной стороны, из-за противоположного действия низких и высоких разведений, с другой стороны, в зависимости от стадии нагноения:
 - разведения С5 благоприятствуют отделению гноя или образованию гнойника;
 - разведения С30 способствуют рассасыванию гноя;
 - разведения С9 действуют в зависимости от клинической стадии.

По этой причине не следует использовать слабые разведения Гепар сульфур, если нагноение происходит в закрытой полости или при недостаточном оттоке гноя.

Повторение приемов зависит от назначенного разведения и преследуемой цели.

- пустулезные угри;
- герпес;
- хроническая кожная стафилококковая инфекция;
- язвы нижних конечностей, гиперчувствительные к прикосновениям, легко кровоточащие, с возможным гнойным отделяемым.

Оториноларингология

- острый гипералгический ларингит, хрипота, глухой и "лающий" кашель после сильного переохлаждения; обильное потоотделение не приносит большого облегчения;
- ринит и слизисто-гнойный ринофарингит;
- аденоидит;
- эритематозно-гнойный тонзиллит;
- гнойный риносинусит, хронический синусит, обостряющийся зимой и от холода;
- острый средний отит, гноетечение из уха.

Пульмонология

- трахеобронхит с сухим и глухим кашлем, который затем становится влажным; кашель усиливается в начале и конце ночи, от холодного воздуха, холодных напитков, переохлаждения;
- катаральный трахеобронхит;
- бронхит, вызывающий диспноэ, с тенденцией к суперинфекции, расширение бронхов.

Стоматология

- зубной абсцесс (нагноение следует как можно скорее дренировать);
- профилактика одонтогенных инфекций, за исключением профилактики инфекционного эндокардита.

Офтальмология

- гнойный конъюнктивит;
- ячмень;

Педиатрия

- младенческая диарея (липкий стул зеленоватого цвета с резким запахом);
- гнойные процессы;
- расстройства поведения.

Урология

- профилактика рецидивов хронического простатита.

Гинекология

- профилактика рецидивов эндометрита.

Другие назначения

- хронические очаги инфекции, устойчивые к терапии антибиотиками.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Гепар сульфур возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Гепар сульфур

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Гепар сульфур

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>