

ДРОЗЕРА С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Дрозера

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Дрозера

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
ДРОЗЕРА (DROSERA)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Нафтохиноны определяют большую часть фармакодинамических свойств растения Дрозера, т.е.:

- антибактериальный эффект в отношении определенных микроорганизмов,
- противокашлевое действие,
- спазмолитическое действие: профилактика бронхоспазма, вызванного ацетилхолином

Показания препарата Дрозера

Ключевые симптомы для назначения препарата

- катаральное раздражение слизистой с ощущением щекотки или инородного тела, вызывающего кашлевой рефлекс;
- спастический кашель, в основном ночью, с затрудненным дыханием;
- боли в костях (в особенности в длинных костях и позвоночнике);
- боли в суставах (плечевом, бедренном) как от удара или укола, усиливающиеся при пальпации;
- Жар, лихорадка с давящей головной болью в лобно-височной области.

Основные случаи клинического применения

1. ЛОР-органы

- Ларингит и трахеобронхит со спастическим судорожным кашлем, в основном ночью.
- Рецидивирующий ринофарингит с кашлем у детей с лимфоаденопатией

2. Инфектология

- Инфекции, вызванные вирусом коклюша и респираторно-синцитиальным вирусом, с характерным кашлем, рвотой, вызванной приступами кашля и приливами крови к лицу во время приступов.
- Приступы мезентериального лимфаденита у детей с туберкулиновым реактивным типом
- Кашель, связанный с трахеобронхиальными аденопатиями (первичные туберкулезные инфекции), вызывающая приступы кашля из-за сдавления;
- Мокрота в виде желтоватой нитевидной слизи, иногда с прожилками крови;

3. Ревматология

- Транзиторный синовит тазобедренного сустава
- Реактивный артрит

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;

- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Дрозера возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Дрозера

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Дрозера

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14