

Игнатия амара С30 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

[VOIRON](#) (Франция)

Контакты для обращений:

[БУАРОН](#) (Франция)

Код АТХ: [V30](#) (Не присвоен)

Лекарственные формы

мг Игнатия амара	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Игнатия амара

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Игнатия амара (Ignatia amara)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: [Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения](#)

Фармако-терапевтическая группа: [Гомеопатическое средство](#)

Фармакологическое действие

Игнатия - вьющийся кустарник, произрастающий на Филиппинах; относится к виду ядовитых ореховых деревьев. Плод представляет собой ягоду, покрытую коркой, приблизительно 10 см в диаметре, содержащую многочисленные семена в середине желтоватой мякоти.

Химический состав:

- большое количество индоловых алкалоидов: стрихнин (60% всех алкалоидов) и бруцин.

Состав аналогичен составу рвотного ореха (*Nux vomica*), однако Игнатия содержит большее количество стрихнина.

Игнатия амара обладает эффектами психостимулятора из-за наличия алкалоидов, которые являются конкурентными ингибиторами нейротрансммиттера глицина (см. Нукс вомика).

Показания препарата Игнатия амара

Ключевые симптомы для назначения препарата

- связь заболеваний с психической травмой;
- гиперчувствительность к боли;
- гиперчувствительность к запахам, особенно табака, за исключением случаев, когда пациент курит сам;
- чувство общей слабости приблизительно в 11 ч утра на фоне вегетососудистой дистонии;

- ощущение "комка в горле" и затруднение дыхания;
- мигрень или головная боль, описываемая как ощущение "вбивания гвоздя в теменную или затылочную область";
- внезапные диффузные или "точечные" боли.

Основные случаи клинического применения

Препарат Игнатия амара назначают гиперчувствительным пациентам "в состоянии депрессии", "измученным", с наличием:

- функциональных нарушений спастического характера, которые легко изменяются и являются парадоксальными;
- психических нарушений, являющихся последствием эмоциональных переживаний, беспокойства, горя;
- органических поражений, часто рецидивирующих и возникающих в стрессовых состояниях.

Вегетососудистая дистония

- функциональные синдромы (лабильные, противоречивые), вызванные разочарованиями в социальной сфере и приводящие к стрессу со следующими проявлениями:
 - вздохи;
 - ощущение "комка в горле";
 - аэрофагия;
 - зевота;
 - колика;
 - одышка без причины;
 - спастический кашель;
 - эмоциональная тахикардия;
 - подергивание мышц.

Поведенческие нарушения

- тревожные расстройства;
- эпизоды задержки дыхания;
- нарушения сна;
- реактивные депрессивные синдромы.

Состояния, обусловленные стрессом

- головные боли, мигрень;
- мышечные контрактуры (боль в шее, люмбаго);
- гастрит, пептическая язва;
- заболевания толстой кишки, геморрагический ректоколит;
- бронхоспазм, усиление приступов астмы аллергического происхождения;
- спастическая гипертония.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Игнатиа амара возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Игнатиа амара

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Игнатиа амара

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14