

# Ипека С9 (Буарон)

## Владелец регистрационного удостоверения:

[VOIRON](#) (Франция)

## Контакты для обращений:

[БУАРОН](#) (Франция)

Код АТХ: [V30](#) (Не присвоен)

## Лекарственные формы

мг Ипека	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав продукта Ипека

<i>Гранулы гомеопатические</i>	<b>Разведение</b>
Ипека (Иреса)	С9

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** [Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения](#)

**Фармако-терапевтическая группа:** [Гомеопатическое средство](#)

### Фармакологическое действие

Ипека изготавливается из корня *Serphaelis ipescuanha* (Brot.) Rich., бразильского травянистого растения, также известного под именем ипекакуана Матто-Гроссо.

Химический состав:

- крахмал, смола, минеральные соли;
- алкалоиды, производные изохинолина (эметин, цефаэлин, психотрин);
- растворимый танин, ипекакуановая кислота – средство против диареи;
- гетерозид (ипекакозид) - спазмолитическое средство;
- гликопротеины, вызывающие аллергию.

Состав препарата Ипека и свойства его алкалоидов, в частности, объясняют его терапевтическое использование в аллопатической медицине: в низких дозах *Serphaelis ipescuanha* оказывает отхаркивающее действие (благодаря цефаэлину) и входит в состав сиропов от кашля; в более высоких дозах используется в виде порошка или сиропа как рвотное средство (благодаря эметину).

## Показания препарата Ипека

**Ключевые симптомы для назначения**

- тошнота, при которой рвота не приносит облегчение;
- одышка;
- кровотечения алой кровью.

### **Основные случаи клинического применения**

#### *Пульмонология*

- спастический, вызывающий рвоту, кашель;
- острый бронхит, бронхиолит;
- астма;
- бронхоспазм (использование бронхолитиков быстрого действия необходимо при отсутствии заметного улучшения);
- коклюшеподобный кашель и коклюш с приступами, вызывающими посинение лица и рвоту;
- мокрота с примесью крови.

#### *Гастроэнтерология*

- сильная тошнота и рвота, язык чистый или с небольшим налетом, обильное слюноотделение;
- токсикоз начала беременности с обильным слюноотделением;
- гастроэнтерит;
- диарея после поедания незрелых фруктов или связанная с началом холодов;
- геморрагический ректоколит.

### **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

### **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

### **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

### **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Ипека возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения продукта Ипека**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

### **Срок годности продукта Ипека**

Срок годности - 5 лет.

### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

**Контакты для обращений**  
**БУАРОН** (Франция)



**BOIRON**

Представительство в России  
ООО "Буарон"  
127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11  
Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14