

Калиум бихромикум С9

Владелец регистрационного удостоверения:

[VOIRON](#) (Франция)

Контакты для обращений:

[БУАРОН](#) (Франция)

Код АТХ: [V30](#) (Не присвоен)

Лекарственные формы

мг Калиум бихромикум	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Калиум бихромикум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Калиум бихромикум (Kalium bichromicum)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: [Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения](#)

Фармако-терапевтическая группа: [Гомеопатическое средство](#)

Фармакологическое действие

Бихромат калия представляет собой красно-оранжевые кристаллы, растворимые в воде.

Показания препарата Калиум бихромикум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- резко начинающиеся и проходящие боли;
- блуждающие боли;
- точечные боли;
- изжога, жжение в желудке;
- клейкие густые выделения;
- географический язык.

Основные случаи клинического применения

Гастроэнтерология

- гастрит, язва желудка или гастродуоденит с язвенными дефектами, у которых ровные, четко очерченные, как будто обрезанные края (основное лечение, профилактическое лечение).

Оториноларингология

- гнойная или слизисто-гнойная ринорея, острая или хроническая;
- фронтальный или верхнечелюстной риносинусит с характерными выделениями;
- тубоотит;
- язвенно-пленчатая ангина;
- озена с желтоватыми, вызывающими тошноту корками.

Гинекология

- густые зеленоватые бели.

Ревматология

- люмбаго, ишиас;
- боли в пятках, тендинит (плечо теннисиста).

Дерматология

- варикозные язвы, четко очерченные;
- импетигинизированная экзема;
- контактная экзема аллергического или токсического происхождения, либо вызванная раздражением, соответствующая характеристикам препарата вне зависимости от этиологии;
- импетиго.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Калиум бихромикум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Калиум бихромикум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Калиум бихромикум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14