

КАЛЬКАРЕА КАРБОНИКА ОСТРЕАРУМ С15

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: ЛП-000956 от 18.10.11 – *Бессрочно* Дата
перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Калькареа карбоника остреарум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Калькареа карбоника остреарум (Calcarea carbonica ostrearum)	С15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат животного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Calcarea carbonica ostrearum - устричная известь, вещество, извлекаемое из нижележащего слоя раковины *Casostrea angulata* после того, как убран белый блестящий слой, называемый перламутром. Вещество представляет собой беловатый порошок с характерным запахом (запахом океана), практически нерастворимый в воде и в спирте.

Основным компонентом устричной извести является карбонат кальция, который составляет более 90% от общей массы. Кроме того, устричная известь содержит:

- карбонат магния;
- сульфат кальция;
- диоксид кремния;
- соли марганца, железа и алюминия;
- органические вещества, такие как конхиолин, состоящий из многочисленных аминокислот, главным образом, гликокола, лизина, аргинина и тирозина.

Показания препарата Калькареа карбоника остреарум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- нарушения питания, роста и развития костей;
- полипозные разрастания;
- склонность к поеданию несъедобного (например, мела, песка);
- непереносимость молока;
- последствия перенесенного рахита;
- чрезмерная потливость волосистой части головы с кислым запахом пота;
- лимфаденопатия.

Основные случаи клинического применения

Оториноларингология

- острая патология ЛОР-органов в сочетании с тяжелыми шейно-верхнечелюстными лимфаденопатиями у детей.

Дерматология

- дерматозы у грудных детей: атопический дерматит, себорейный дерматит, ягодичная эритема, корочки на голове, из которых сочится прозрачная жидкость;
- бородавки (препарат особенно показан при одной объемной подошвенной бородавке).

Пульмонология

- астма.

Патология развития

- нарушения развития (задержка умения ходить или прорезывания зубов);
- раннее менархе, обильные менструации, набухание молочных желез перед менструацией.

Гастроэнтерология

- расстройства пищеварения;
- изжога, отрыжка кислым;
- у грудных детей срыгивания с кислым запахом;
- непереносимость молока;
- желание употреблять в пищу яйца.

Паразитология

- энтеробиоз.

У взрослых

Урология

- мочекаменная болезнь, полипоз мочевого пузыря.

Метаболизм и питание

- патологии, связанные с избыточным весом и нарушением обмена веществ (ожирение, гиперлипидемии, подагра, преддиабет).

Неврология

- мигрень.

Дерматология

- экземы;
- атопический дерматит.

Пульмонология

- конституциональное лечение астмы.

Дегенеративная патология

- склеротическая гипертензия;
- артроз;
- профилактика рецидивов при полипозах.

Гастроэнтерология

- желчнокаменная болезнь.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Калькареа карбоника острearум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Калькареа карбоника острearум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Калькареа карбоника острearум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва

Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10

Факс: (495) 956-08-14

E-mail: info@boiron.ru <http://www.boiron.ru>

