

КАЛЬКАРЕА ФОСФОРИКА С15 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Калькареа фосфорика	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Калькареа фосфорика

Гранулы гомеопатические	Разведение
КАЛЬКАРЕА ФОСФОРИКА (CALCAREA PHOSPHORICA)	С15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Фосфорнокислая известь используется в измеряемых дозах в лекарственных препаратах общепринятой медицины:

- для стимуляции образования костной ткани и лечения переломов,
- для лечения рахита.

Показания препарата Калькареа фосфорика

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Боли в костях и суставах, часто локализованные в:
 - - эпифизах,
 - - диафизах трубчатых костей,
 - - спинных остистых отростках,
 - - симфизах.
- Медленное развитие и быстрое разрушение зубов
- Головная боль, внутричерепная гипертензия.
- Анемия.
- Онемение и покалывание.
- Необычайная простудливость.

Основные случаи клинического применения

1. Гастроэнтерология

- Нарушения пищеварения у младенцев.

2. Нарушения роста

- Профилактика дистрофии роста, в качестве дополнения к ортопедическому лечению: кифоз, болезнь Осгуда-Шлаттера, болезнь Шейермана (*Силицеа (Silicea)*).
- Головная боль от умственного перенапряжения.
- Астения у подростков, период выздоровления после заболеваний, вызывающих астению.
- Кариес, патология эмали

3. Заболевания уха, горла, носа

- Часто повторяющиеся инфекции уха, горла, носа и лёгких.
- Гипертрофированные миндалины и аденоиды.

4. Дерматология

- Акне.

5. Травматология

- Профилактика костных мозолей, замедленного сращения костей (совместно с Симфитум).

6. Ревматология

- Подвздошно-крестцовая артралгия
- Боль в области лобка (особенно после родов)
- Альгодистрофия

7. – Гинекология

- Лейкорея, дисменорея и гиперменорея у девочек чувствительного типа.
- Анемия.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Калькареа фосфорика возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Калькареа фосфорика

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Калькареа фосфорика

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14