

КОЛОЦИНТИС С15

Владелец регистрационного удостоверения:

ВОIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Колоцинтис

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Колоцинтис (Colocynthis)	С15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Горькое яблоко (горький огурец) - травянистое стелющееся растение. Желтые цветы дают корковидные губчатообразные желто-зеленые шаровидные ягоды размером с небольшие апельсины, содержащие семена.

Citrullus colocynthis содержит гликозид кукурбитацин, который также присутствуют в Bryonia alba. Кукурбитацин обладает сильным слабительным эффектом, а также оказывает противоопухолевое действие.

Кроме того, Citrullus colocynthis содержит хлорогеновую кислоту.

Показания препарата Колоцинтис

Ключевые симптомы для назначения препарата

- сильные боли спастического характера, которые заставляют пациента "согнуться пополам";
- пациент постоянно кричит и жалуется;
- ощущение сжатия "как железным зажимом".

Основные случаи клинического применения

Болезненные спастические синдромы

Гастроэнтерология

- боль спастического характера в эпигастральной области, вызывающая рвоту (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки);

- печеночная колика;
- спастические заболевания толстой кишки, колики у младенца (очень болезненные, облегчение наступает в положении лежа на животе);
- болезненная диарея с сильными позывами.

Облегчение боли при сгибании бедер и/или ее появление после приступа гнева являются достаточными условиями для назначения Колоцинтис.

Урология

- почечная колика (особенно левосторонняя), облегчение наступает при сгибании бедра (с той же стороны, что и боль) по направлению к тазу.

Гинекология

- дисменорея: альгоменорея со спазмами (облегчение приносит вынужденное положение, при котором пациентка наклоняется вперед, прижимая туловище к ногам, а также применение тепла и сильное надавливание на болезненную область).

Неврология

- лицевая боль:
 - нестерпимая боль, обычно с левой стороны (но не всегда), вызванная небольшим надавливанием на триггерную зону;
 - облегчение наступает при применении тепла, возможно при сильном надавливании в начале приступа
- невралгия седалищного или бедренного нерва:
 - острая "дергающая" и/или "стреляющая" боль спастического характера, преимущественно слева; боль сопровождается ощущением онемения;
 - облегчение наступает при сгибании бедра по направлению к тазу, при нагревании, движении, сильном надавливании на болезненную область;
 - усиливается при растягивающих движениях, на холоде, в покое, при резком прикосновении.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Колоцинтис возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Колоцинтис

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Колоцинтис

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



Представительство в России ООО "Буарон"

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>