

ЛИКОПОДИУМ КЛАВАТУМ С30 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Ликоподиум клаватум	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Ликоподиум клаватум

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
ЛИКОПОДИУМ КЛАВАТУМ (LYCOPODIUM CLAVATUM)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Ликоподиум клаватум (*Lycopodium clavatum*), или плаун булавовидный, также известный как «волчий коготь», представляет собой травянистый папоротник, который растёт в болотистых лесах Восточной Европы и Китая; его сухие споры используются для изготовления матричной настойки.

Эти споры, которые в течение долгого времени считались инертными, содержат многочисленные вещества, обуславливающие фармакодинамическое действие Ликоподиум клаватум (*Lycopodium clavatum*).

- 3-4% минеральных веществ: оксиды кальция, магния, сера, алюминий, кремний, железо, следы марганца;
- следы углеводов;
- жиры;
- следы алкалоидов (0,2%): ликоподин, клаватин, клаватоксин.

Показания препарата Ликоподиум клаватум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Голод, который быстро удовлетворяется (*Нукс вомика (Nux vomica)*)
- Ощущение наполненности после первого проглоченного куска
- Вздутие и дискомфорт вокруг талии, иногда с урчанием в левом углу кишечника
- Преждевременно состарившийся
- Зуд, уменьшающийся на холоде
- Ощущение жжения между лопатками
- Ощущение, что одна нога холодная, а другая нога тёплая

Основные случаи клинического применения

1. Гастроэнтерология

- **Диспептические расстройства, метеоризм, изжога, гастрит**
- **Боли в желчном пузыре**, которые связаны с дискинезией желчевыводящих путей (с литиазом или без него), что наблюдается во время пероральной холецистографии или внутривенной холангиографии с использованием теста Бойдена.
- **Мигрени** и головная боль, связанные с пищеварением, у пациентов с клиническими признаками, соответствующими одной или нескольким локальным или общим характеристикам лекарственного препарата.
- **Язва двенадцатиперстной кишки**: профилактика рецидива, лечение боли, которая усиливается к концу дня (примерно к 17.00).
- **Младенческие колики**, сопровождающиеся вздутием кишечника и газами, особенно у детей с недостатком массы тела..
- **Запор у детей, геморрой.**
- **Потеря аппетита у детей.**
- **Циклическая рвота**

2 – Урология

- **Камни в мочевом пузыре**, преимущественно, но не всегда, мочекишечные. *Калькареа карбоника остреарум (Calcareea carbonica ostrearum)* является часто назначаемым комбинированным лекарственным препаратом как для лечения хронического заболевания, так и при приступе почечных колик.
- Простатит

3 – Дерматология

- Экзема (у младенцев и взрослых), если, кроме хронических показаний (реактивный тип и/или чувствительный тип), у пациента имеются следующие особенности:
 - экзема быстро кровоточит при малейшем контакте и

- интенсивный зуд, уменьшающийся на холоде
- Себорейный дерматит, экзема в предгрудинной области
- Гистаминная или холинергическая хроническая крапивница
- Кератоз на пятках с трещинами.
- Сухость кожи.

4 – Отоларингология

- **Хронический насморк** (сухость ночью и выделения в течение дня).
- Острая повторно возникающая боль в горле нестрептококкового характера* с воспалением правой миндалины или развивающаяся справа налево.

5 – Пульмонология

- Заболевания лёгких, поражающее основание правого лёгкого.
- Лечение хронической астмы

* Перед назначением гомеопатического лечения рекомендуется сделать тест на бета-гемолитический стрептококк.

6. – Расстройства поведения

- Реактивная депрессия, иногда с психосоматическими симптомами
- Укачивание
- Тики у детей и подростков

7. – Нарушения обмена веществ

- Прогрессирующее повышение уровня мочевой кислоты
- Прогрессирующее повышение уровня креатинина, в дополнение к лечению препаратами общепринятой медицины
- Гиперлипидемия умеренной степени

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Ликоподиум клаватум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Ликоподиум клаватум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Ликоподиум клаватум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14