

МЕДОРРИНУМ С30 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

МГ Медорринум

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Медорринум

Гранулы гомеопатические	Разведение
МЕДОРРИНУМ (MEDORRHINUM)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат животного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Данный лекарственный препарат изготовлен из лизата выделений уретры больных гонореей, взятых до начала лечения. Изготавливается с соблюдением правил вирусной безопасности*.

* Доноры выбираются по критериям безопасности и здоровья, утверждённым AFFSAP (Французское агентство по безопасности лекарственных препаратов) для регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, производимые из донорского материала. Данные критерии соответствуют Европейским рекомендациям.

Показания препарата Медорринум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- рост кожно-слизистых новообразований: моллюски, кондиломы, бородавки;
- обильное серозное отделяемое из отверстий, особенно влагалища у женщин
- наличие катарального воспаления в одной или нескольких слизистых оболочках;
- медленно и прогрессирующее развитие различных заболеваний;
- склонность к депрессии и даже одержимости как реакция на имеющиеся заболевания.

Основные случаи клинического применения

1. – Отоларингология

- Хронический ринофарингит с увеличением аденоидов, которые могут быть гипертрофированными или нет, обильное отделяемое, прозрачное.
- Экссудативный средний отит
- Профилактика рецидива болей в горле
- Хронический синусит, полипоз носа и носовых пазух

2. – Пульмонология

- Хронический бронхит
- Лечение хронической астмы

3. – Дерматология

- Пелёночный дерматит
- Неприятно пахнущая мокнущая экзема
- Герпес, особенно генитальный
- Акне
- Небольшие бородавки, подошвенные бородавки, сливающиеся между собой бородавки на щеках
- Контагиозный моллюск, кондиломы, папилломы.

4. – Урология

- Затянувшиеся инфекции мочевых путей.
- Хронический простатит.
- Профилактика рецидива полипоза мочевого пузыря.

5 – Гинекология

- Хронический вагинит.
- Гинекологические инфекции, в частности:
– ВПЧ инфекции,

– хламидиоз: первоочередное показание, так как при данном заболевании идентичное расположение повреждений, как уретровагинальных, так и конъюнктивальных, и патогенетические симптомы, характерные для данного вещества.

- Фибромиома матки и внутриматочные полипы: для ограничения прогрессирования болезни и профилактики рецидивов после их удаления у женщин, имеющих повторные урогенитальные инфекции.

6 – Ревматология

- Дегенеративный или воспалительный ревматизм, особенно в крупных суставах с характерными изменениями; тазовый ревматоидный спондилит.
- Реактивный артрит, особенно если в анамнезе есть синдром Фиссенже-Леруа-Рейтера, симптомы которого подобны патогенетическим симптомам *Медорринум (Medorrhinum)*.

7 – Расстройства поведения

- Нарушения сна у детей, которые совершают ритмичные движения головой по подушке при засыпании, спят на животе или в коленно-локтевой позиции.
- Трудности с обучением в школе по причине проблем с памятью или психомоторным возбуждением с беспорядочными ускоренными движениями.
- Некоторые депрессивные и/или обсессивные состояния.

Медорринум (Medorrhinum) использовался для лечения депрессивных и/или обсессивных состояний у взрослых после хронической инфекции мочеполовых путей, требующей длительного лечения.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Медорринум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Медорринум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Медорринум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14