

# МЕРКУРИУС СОЛЮБИЛИС С30 (БУАРОН)

## Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

## Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

## Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав препарата Меркуриус солюбилис

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Меркуриус солюбилис (Mercurius solubilis)	С30

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

### Фармакологическое действие

Растворимая ртуть Ганемана (Mercurius solubilis) - сероватый порошок, едкий и вяжущий, практически нерастворимый в воде и спирте; содержит 85% ртути (Hg).

### Показания препарата Меркуриус солюбилис

#### *Ключевые симптомы для назначения препарата*

- астения;
- глубокие колющие, стреляющие, пронизывающие боли;
- тенезмы и жжение мочеполовых органов или прямой кишки;
- неприятный запах изо рта;
- набухший, с отпечатками зубов по краям язык;
- гнойные процессы.

#### *Основные случаи клинического применения*

Разведение С5 способствуют нагноению, усилению выделений. Разведения С15 и С30 уменьшают их или способствуют прекращению. Действие разведения С9 может быть амбивалентным в зависимости от клинической стадии и реактивности пациента.

#### *Оториноларингология*

- острые или повторяющиеся ангины нестрептококкового происхождения\*;
- стенозирующий фарингит с рефлекторной оталгией и сопутствующей шейной лимфаденопатией;

- острые или рецидивирующие риниты и ринофарингиты с характерными выделениями и модальностями;
- фронтит с невралгией;
- паротит с гиперемией стенонова протока;
- эпидемический паротит;
- отиты с отореей и ощущением покалывания и жжения.

#### *Офтальмология*

- блефариты и конъюнктивиты, обостряющиеся в тепле и на свету и сопровождающиеся характерными выделениями;
- язвенный кератит.

#### *Пульмонология*

- бронхиты с тенденцией к одышке с аллергическим и инфекционным участием ("микробная аллергия");
- бронхопневмопатии со слизисто-гнойной мокротой.

#### *Гастроэнтерология*

- острая диарея, иногда геморрагическая, с тенезмами;
- язвенный колит, ректоколит, сигмоидит, особенно после амебиаза.

#### *Стоматология*

- гингивит с болезненными губчатыми деснами, кровоточащими при малейшем прикосновении;
- зубо-альвеолярная пиорея с вязким, слизисто-гнойным отделяемым;
- пародонтоз с обнажением корней зубов и характерным "ртутным ртом";
- стоматит, в т.ч. афтозный, с поверхностными вялотекущими эрозиями;
- абсцессы десен.

#### *Урология*

- болезненные уретриты со слизисто-гнойной мочой;
- цистит, сопровождающийся жжением, тенезмами, дизурией, темноокрашенной и иногда кровавистой мочой.

#### *Гинекология*

- вагиниты и вульвовагиниты, сопровождающиеся характерными выделениями и зудом;
- изъязвления шейки матки, сопровождающиеся характерными выделениями.

#### *Нефрология*

- токсическая интерстициальная нефропатия, сопровождающаяся жаждой и слабовыраженными отеками.

#### *Неврология*

- тремор конечностей, усиливающийся при эмоциональных переживаниях и переутомлении;
- цефалгия с характерными признаками.

#### *Расстройства поведения*

- расстройства поведения, связанные с нестабильностью характера, сопровождающиеся сильными приступами гнева у детей, которые, кроме того, склонны к гнойным процессам;

- трудности в школе у беспокойных детей.

### *Дерматология*

- зуд при воспалительных процессах, вызывающих нагноения;
- инфицированная экзема;
- поверхностные обширные инфицированные изъязвления;
- абсцесс, воспаление лимфоузлов с нагноением.

### **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

### **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

### **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

### **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Меркуриус солюбилис возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения препарата Меркуриус солюбилис**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

### **Срок годности препарата Меркуриус солюбилис**

Срок годности - 5 лет.

### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

\* Перед каждым гомеопатическим курсом лечения рекомендуется осуществлять тест на выявление ангин с  $\beta$ -гемолитическим стрептококком.

### **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



**Представительство в России  
ООО "Буарон"**

127006 Москва  
Долгоруковская ул. 7, эт. 11  
Тел.: (495) 956-08-10  
Факс: (495) 956-08-14  
E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)  
<http://www.boiron.ru>