

Меркуриус солюбилис С9

Владелец регистрационного удостоверения:

BOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: **V30** (Не присвоен)

Лекарственные формы

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - Бессрочно Дата перерегистрации:
13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - Бессрочно Дата перерегистрации:
13.04.18

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - Бессрочно Дата перерегистрации:
13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 - Бессрочно Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Меркуриус солюбилис

Гранулы гомеопатические	Разведение
Меркуриус солюбилис (Mercurius solubilis)	C9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: [Гомеопатическийmonoкомпонентный препарат минерально-химического происхождения](#)

Фармако-терапевтическая группа: [Гомеопатическое средство](#)

Фармакологическое действие

Растворимая ртуть Ганемана (Mercurius solubilis) - сероватый порошок, едкий и вяжущий, практически нерастворимый в воде и спирте; содержит 85% ртути (Hg).

Показания препарата Меркуриус солюбилис

Ключевые симптомы для назначения препарата

- астении;
- глубокие колющие, стреляющие, пронизывающие боли;
- тенезмы и жжение мочеполовых органов или прямой кишки;
- неприятный запах изо рта;
- набухший, с отпечатками зубов по краям языка;
- гнойные процессы.

Основные случаи клинического применения

Разведение С5 способствуют нагноению, усилинию выделений. Разведения С15 и С30 уменьшают их или способствуют прекращению. Действие разведения С9 может быть амбивалентным в зависимости от клинической стадии и реактивности пациента.

Оториноларингология

- острые или повторяющиеся ангины нестrepтококкового происхождения*;
- стенозирующий фарингит с рефлекторной оталгией и сопутствующей шейной лимфаденопатией;
- острые или рецидивирующие риниты и ринофарингиты с характерными выделениями и модальностями;
- фронтит с невралгией;
- паротит с гиперемией стенонова протока;
- эпидемический паротит;
- отиты с отореей и ощущением покалывания и жжения.

Офтальмология

- блефариты и конъюнктивиты, обостряющиеся в тепле и на свету и сопровождающиеся характерными выделениями;
- язвенный кератит.

Пульмонология

- бронхиты с тенденцией к одышке с аллергическим и инфекционным участием ("микробная аллергия");
- бронхопневмопатии со слизисто-гнойной мокротой.

Гастроэнтерология

- оструя диарея, иногда геморрагическая, с тенезмами;
- язвенный колит, ректоколит, сигмоидит, особенно после амебиаза.

Стоматология

- гингивит с болезненными губчатыми деснами, кровоточащими при малейшем прикосновении;
- зубо-альвеолярная пиорея с вязким, слизисто-гнойным отделяемым;
- пародонтоз с обнажением корней зубов и характерным "ртутным ртом";
- стоматит, в т.ч. афтозный, с поверхностными вялотекущими эрозиями;
- абсцессы десен.

Урология

- болезненные уретриты со слизисто-гнойной мочой;
- цистит, сопровождающийся жжением, тенезмами, дизурией, темноокрашенной и иногда кровянистой мочой.

Гинекология

- вагиниты и вульвовагиниты, сопровождающиеся характерными выделениями и зудом;
- изъязвления шейки матки, сопровождающиеся характерными выделениями.

Нефрология

- токсическая интерстициальная нефропатия, сопровождающаяся жаждой и слабо выраженным отеками.

Неврология

- трепет конечностей, усиливающийся при эмоциональных переживаниях и переутомлении;
- цефалгия с характерными признаками.

Расстройства поведения

- расстройства поведения, связанные с нестабильностью характера, сопровождающиеся сильными приступами гнева у детей, которые, кроме того, склонны к гнойным процессам;
- трудности в школе у беспокойных детей.

Дерматология

- зуд при воспалительных процессах, вызывающих нагноения;
- инфицированная экзема;
- поверхностные обширные инфицированные изъязвления;
- абсцесс, воспаление лимфоузлов с нагноением.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Меркуриус солюбилис возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Меркуриус солюбилис

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Меркуриус солюбилис

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

* Перед каждым гомеопатическим курсом лечения рекомендуется осуществлять тест на выявление ангин с β-гемолитическим стрептококком.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)

BOIRON



Представительство в России
ООО "Буарон"
127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14