

НУКС ВОМИКА С15 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

ВОIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Нукс вомика

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Нукс вомика (Nux vomica)	C15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Nux vomica изготавливается из высушенных семечек рвотного ореха, дерева с непадающей листвой родом из Юго-Восточной Азии.

Химический состав:

- жирные кислоты;
- полисахариды;
- иридоиды, среди которых логанозид;
- алкалоиды (3%), главным образом стрихнин (45% алкалоидов) и бруцин – основные активные вещества; также присутствуют следы малых алкалоидов - колубрина, вомицина, новацина.

Стрихнин и бруцин – специфические антагонисты глицина, постсинаптическое действие которого они блокируют.

Показания препарата Нукс вомика

Ключевые симптомы для назначения препарата

- гиперчувствительность к свету, шуму, запахам, малейшим прикосновениям;
- гиперчувствительность к холоду (ощущение холода, озноб на прохладном воздухе);
- судороги икроножных мышц и пальцев ног;
- колики с приступами тошноты, которые не приводят к рвоте;
- склонность к спастическим процессам;

- запор;
- кровоточащий геморрой;
- вздутие живота.

Основные случаи клинического применения

Расстройства поведения

- раздражительность, вспыльчивость, агрессивность, поведение, связанное с различными типами зависимости;
- спазмы, гиперчувствительность к шуму, запахам, прикосновениям, общая рефлекторная гипервозбудимость;
- укачивание;
- бессонница (сложно заснуть, затем пробуждение около 3 ч утра – в ситуации переутомления; мышление настолько ускоренное, что больной с трудом засыпает и просыпается усталым).

Гастроэнтерология

- диспепсия:
 - с обложенным языком, покрытым желтовато-белым налетом в задней части;
 - приступы тошноты, облегчаемые рвотой;
 - диарея в виде повторяющихся необильных жидких испражнений;
 - запоры с позывами на дефекацию, не приводящими к стулу;
 - головная боль.
- зудящий, болезненный геморрой (улучшение наступает от сидячих холодных ванн);
- лечение и предупреждение избыточного эпизодического употребления продуктов и напитков, содержащих алкоголь;
- младенческие колики, сопровождающиеся спазмами ЖКТ, от которых ребенок плачет.

Оториноларингология

- острые риниты, возникающие после переохлаждения (простуды), с многократным чиханьем во время пробуждения, с водянистой ринореей, сопровождающейся зудом в носу или заложенностью носа и сухостью слизистых оболочек; улучшение при ринорее происходит на открытом воздухе;
- аллергические риниты, периодические или не периодические, с чиханием "залпами" при пробуждении, при вставании с постели или в течение дня.

Инфектология

- фебрильные состояния с дрожью, напоминающие псевдомаларийный приступ (пациент дрожит при малейшем движении или как только раскрывается, не может согреться); сильная жажда в момент скачков температуры.

Сочетание характерного острого ринита и ломящих болей (ночные боли в пояснице, при которых больному приходится садиться в кровати, чтобы перевернуться) делает Нукс вомика эффективным лекарственным средством для лечения гриппозного синдрома.

Кардиология

- спазматическая артериальная гипертензия; Нукс вомика также назначается в случаях, когда АД остается нестабильным, несмотря на лечение гипотензивными средствами.

Прочие показания

- патология, возникающая по причине интоксикации (алкоголь, кофе, табак, возбуждающие средства, лекарственные средства);
- головные боли, мигрень у пациентов, проявляющих свойства чувствительного типа;
- бронхоспазм с ночными приступами около 3 ч ночи;
- люмбаго с ночным обострением, при котором пациенту трудно переворачиваться в постели;

- задержка мочи и послеоперационный цистит с позывами, которые не приводят к мочеиспусканию.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Нукс вомика возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Нукс вомика

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Нукс вомика

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)

Представительство в России ООО "Буарон"



127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>