

ПОДОФИЛЛЮМ ПЕЛТАТУМ С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

МГ Подофиллюм пелтатум	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Подофиллюм пелтатум

Гранулы гомеопатические	Разведение
ПОДОФИЛЛЮМ ПЕЛТАТУМ (PODOPHYLLUM PELTATUM)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Майское яблоко растёт во влажных лесах в восточной части Соединённых Штатов Америки и Канады. Это многолетнее растение с горизонтальным корневищем, двумя черешковыми листьями, цветком и плодами.

Используется его сухое корневище.

Активные вещества состоят, в основном, из смолы, подофиллина, которая содержит лиганы; они встречаются или в свободном состоянии, или в виде гликозидов (подофиллотоксин, альфа-пелтатин, бета-пелтатин).

Показания препарата Подофиллюм пелтатум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Сильная слабость.
- Чувство пустоты в животе после диареи.
- Выпадение прямой кишки
- Чередование состояний
 - головная боль/диарея.
 - запор/диарея.

Основные случаи клинического применения

– Гастроэнтерология

- Симптоматическое лечение острой диареи.
- «Диарея туристов».
- Водянистая диарея различного цвета, вонючая, обильная, вырывается сильной струей.
- Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей, сопровождающиеся головной болью. Желтуха.
- Синдромы частичной блокады, вызванные желчнокаменной болезнью. Важно клиническое наблюдение с проведением ультразвуковых исследований.
- Выпадение прямой кишки, геморрой.

2 • Гинекология

- Боль в яичниках, сопровождающаяся расстройством пищеварения.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Подофиллум пелтатум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Подофиллум пелтатум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Подофиллум пелтатум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14