

Рус Токсикодендрон С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

BOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

мг Рус токсикодендрон	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Рус токсикодендрон

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Рус токсикодендрон (<i>Rhus toxicodendron</i>)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Rhus toxicodendron (Ядовитый плющ) - многодомный кустарник, периодически сбрасывающий листья, с тройчатосложными листьями, произрастающий на территории США и Японии.

Химический состав:

- производные фенола (урушиолы);
- галловый танин;
- флавоноид физетин.

Показания препарата Рус токсикодендрон

Ключевые симптомы для назначения препарата

- боль, образование синяков, ригидность, онемение;
- сухость во рту и глотке (при лихорадочном состоянии);
- "разрывающая", тянущая невралгия;

- герпетические высыпания;
- улучшение всех симптомов от движения.

Основные случаи клинического применения

Дерматология

Все типы эритематозных и отечных или везикулярных заболеваний кожи:

- экзема;
- инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, в т.ч. лабиальный герпес.

Рус токсикодендрон обычно назначают при первичном заражении и рецидивирующем герпесе, вызванном вирусом простого герпеса типа 1 и 2 (HSV1 и HSV2); в таких случаях лечение следует начинать как можно быстрее: при рецидивах наилучшие результаты достигаются при применении препарата до появления пузырьков, когда отмечаются только предварительные признаки. Это позволяет уменьшить проявления заболевания и иногда даже предотвратить его развитие. После длительного лечения частота рецидивов постепенно снижается.

- опоясывающий лишай (улучшение наступает быстрее при раннем начале лечения);
- розацеа.

Ревматология

- ревматические боли, вызванные или усиливающиеся при повышенной влажности;
- ишиалгия с "раздирающей" болью, тянущими болями вдоль нервных путей, усиливающимися в покое и уменьшающимися при движении.

Рус токсикодендрон назначают, например, при ишиалгии, возникающей после того, как пациент попал под дождь, или после переохлаждения в результате потоотделения.

Травматология

- вывихи, боль при вывихах после репозиции;
- тенденция к мышечной усталости; чрезмерная нагрузка на мышцы.

Инфектология

- грипп, гриппоподобные состояния;
- микробные инфекции, особенно вирусные (в т.ч. вызванные вирусом герпеса), с выраженными клиническими симптомами;
- лихорадка денге;
- ветряная оспа.

При инфекционных состояниях, когда возникает необходимость применения антибактериальных препаратов, Рус токсикодендрон может оказаться полезным и эффективным дополнением.

Отоларингология

- охриплость голоса и дисфония.

Препарат назначают в случаях дисфонии, начинающейся при попытке пациента заговорить или запеть и уменьшающейся впоследствии. Данное явление часто связано с сильным голосовым напряжением.

- герпетический гингивостоматит;
- герпетическая ангина.

Офтальмология

- фликтенулезный кератоконъюнктивит;

- герпетический кератоконъюнктивит;
- воспаление радужной оболочки.

Примечание: Данное лечение требует специального контроля.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Рус токсикодендрон возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Рус токсикодендрон

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Рус токсикодендрон

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14