

ХАМОМИЛЛА ВУЛЬГАРИС С15 (БУАРОН)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Хамомилла вульгарис

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Хамомилла вульгарис (Chamomilla vulgaris)	С15

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Chamomilla vulgaris (Немецкая или дикая ромашка) - кустовое растение, произрастающее спонтанно в большом количестве повсеместно в Европе.

Химический состав:

- флавоноиды, обладающие седативным и спазмолитическим эффектом;
- эфирное масло, содержащее лактон (матрицин) и сесквитерпены (хамазулен, α-бисаболол);
- кумарины.

Препарат обладает противовоспалительным, противогрибковым (особенно, в отношении инфекций, вызванных *Candida*), антибактериальным и противоязвенным эффектами.

Показания препарата Хамомилла вульгарис

Ключевые симптомы для назначения препарата

- боль ("дергающая", "стреляющая" или спастического характера);
- покалывание и онемение с болью;
- застой крови, обычно локализованный в области щек (с одной стороны лица есть признаки застоя крови, щека теплая, другая щека - холодная и бледная);
- боль в нижних конечностях с чувством жжения по ночам;
- улучшение при укачивании, ухудшение при возбуждении и раздражении.

Основные случаи клинического применения

Педиатрия

- боль при прорезывании зубов у младенцев, сопровождающаяся раздражительностью, плаксивостью, в то время как обычно ребенок спокоен;
- фебрильная лихорадка при прорезывании зубов, отите, гастроэнтерите, бронхите;
- колики в животе с резким возбуждением.

Поведенческие расстройства

Лечение боли

- гипералгезия у гиперчувствительных пациентов, независимо от причин, в т.ч.:
 - зубная боль;
 - ишиалгия;
 - колика (печеночная, почечная, кишечная);
 - дисменорея.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Хамомилла вульгарис возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Хамомилла вульгарис

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Хамомилла вульгарис

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



**Представительство в России
ООО "Буарон"**

127006 Москва
Долгоруковская ул. 7, эт. 11
Тел.: (495) 956-08-10
Факс: (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
<http://www.boiron.ru>