

ЭУПАТОРИУМ ПЕРФОЛИАТУМ С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

Лекарственные формы

МГ Эупаториум перфолиатум	Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18
	Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – <i>Бессрочно</i> Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Эупаториум перфолиатум

Гранулы гомеопатические	Разведение
ЭУПАТОРИУМ ПЕРФОЛИАТУМ (EUPATORIUM PERFOLIATUM)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Окопник является многолетним растением с бесчерешковыми листьями и прямым стеблем, высотой до одного метра. Первоначально обнаружен в прериях Северной Америки, в настоящее время также произрастает в Европе.

Матричная настойка готовится из надземной части свежего растения.

Оно содержит:

- метоксильные флавианоиды (эупаторин), с цитотоксическими свойствами,
- стеролы (ситостерол, стигмастерол), обнаруженные в растениях, которые воздействуют на глаза (*Эуфразия оффициналис (Euphrasia officinalis)*, *Физостигма вененозум (Physostigma venenosum)*), а также в *Календула оффициналис (Calendula officinalis)* и *Симфитум оффицинале (Symphytum officinale)*; которые применяются для лечения контузионных болей,
- сесквитерпеновые лактоны,
- полисахариды с противовоспалительными свойствами.

Показания препарата Эупаториум перфолиатум

Ключевые симптомы для назначения препарата

- Чувство ушибов во всем теле, мышечные боли.
- Боли в костях по всему телу, как будто кости сломаны.
- Болезненность глаз с болезненной гиперчувствительностью к давлению.

Основные случаи клинического применения

- Инфектология

В теории все ревматические боли в костях и фебрильные синдромы, при которых бывают боли в мышцах и костях, могут лечиться данным лекарственным препаратом.

На практике грипп и гриппоподобные симптомы являются основным показанием к назначению *Эупаториум перфолиатум (Eupatorium perfoliatum)*, когда имеется болезненность глазных яблок, усиливающаяся даже при малейшем давлении, сопровождающаяся генерализованной болью.

Как отличить необходимость назначения *Эупаториум перфолиатум (Eupatorium perfoliatum)* от *Рус токсикодендрон (Rhus toxicodendron)* и *Гельземиум семпервиренс (Gelsemium sempervirens)* для пациентов с симптомами гриппа:

- пациент *Рус токсикодендрон (Rhus toxicodendron)* испытывает, в основном, мышечные боли, которые уменьшаются при движении, тогда как у пациента *Эупаториум перфолиатум (Eupatorium perfoliatum)* улучшения при движении не происходит;
- пациент *Гельземиум семпервиренс (Gelsemium sempervirens)* также испытывает боли, но он обессилен, дрожит, в полубессознательном состоянии, с ярко-красным лицом, не испытывает жажды.

В действительности, обычно бывает трудно при симптомах гриппа клинически отличить реактивный тип, который соответствует только одному из вышеуказанных лекарственных препаратов. В этом случае самым эффективным подходом будет чередование этих трёх препаратов.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Эупаториум перфолиатум возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Эупаториум перфолиатум

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Эупаториум перфолиатум

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495) 956-08-14